

VİRAL GÜNDEM

Bu içerik **Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü** tarafından hazırlanmıştır.



Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. ▶

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7679116/>

Çocuklar...

- Pediatrik komorbiditelerin çocuk hastalardaki COVID-19 üzerindeki etkileri araştırıldı. Türkiye'den de çalışmanın dahil olduğu 42 çalışmanın yer aldığı meta-analizde;
- 285.004 COVID-19 pozitif çocuk hastanın 9.353'ünde en az bir komorbidite saptandı.
- Bu çocuklarda; içinde obezitenin de yer aldığı, kronik solunum hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar, nörolojik bozukluklar, böbrek hastalığı gibi komorbiditeler saptandı.
- Alta yatan hastalığı olmayan çocuklara göre komorbiditesi olan çocukların COVID-19'un ciddi belirtileri ve enfeksiyon ilişkili ölüm açısından daha yüksek risk altında olduğu belirtildi.

Hastane Dışı Kardiyak Arrest Arttı mı?

- Londra'da yapılan bir çalışmada COVID-19 öncesi ve sonrasındaki hastane dışı kardiyak arrest vakaları ve sonuçları karşılaştırıldı.
- 2019 ve 2020 Mart ve Nisan aylarında şehrin ambulans servisinde tutulan vaka kayıtları incelendi bunun sonucunda COVID-19 salgınının ilk dalgasında, hastane dışı kardiyak arrest insidansında dramatik bir artış ve hayatta kalmada önemli bir azalma saptandı.
- İnsidansın ve mortalitenin artış paterni, ülke genelinde doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonlarının kentteki artışını yakından yansıtıyordu.



Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. ▶

<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2666520420300679?token=D18EB80A21ADBED0D8AD82F03662C3BABFAD77CBEAD9F7B01EDD3DC6F536F14EF50C783076CAE3B3772C47994E28A849>



Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. ▶

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33307933/>

Hemodiyaliz Hastalarında Artan Risk

- Yapılan bir çalışmada hemodiyalize giren ve COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 37 hastanın verileri paylaşıldı.
- Hastaların en sık semptomları yorgunluk (%51), ateş (%43), dispne (%38) ve öksürüktü (%35).
- Hastaneye yatan hastaların 7'si kardiyovasküler sebeple ve respiratuar distres sendromu nedeniyle hayatını kaybetti.
- Araştırmacılar, hemodiyaliz hastalarında enfeksiyona bağlı hastaneye yatışı takiben mortalitenin daha yüksek olduğunu, başvuru anında aneminin, serum albumin düzeyi ve bazal oksijen saturasyonunun düşüklüğünün kötü prognozla ilişkili olduğunu belirttiler.



Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. ▶

<https://preprints.jmir.org/preprint/25469/accepted>

Telepsikiyatri Gündemde...

- ABD'de 244 hastaya, COVID-19 sebebiyle yapılan telepsikiyatri görüşmeleri hakkındaki değerlendirmeleri soruldu;
- Hastaların %83'ü video görüşme, %14'ü telefon ile psikiyatrik muayene olmayı tercih etti. Hastaların %1'i ise yüz yüze görüşmelere kadar muayenelerini ertelemeyi tercih etti.
- Sanal psikiyatri ziyaretlerinin deneyim açısından, katılımcıların çoğunluğunun beklentisini karşıladığı belirtildi.
- Çalışma sonucunda ileri yaşlarda telefon görüşmesinin video görüşmesine tercih edildiği tespit edildi.